


این راهنما جهت آشنایی شما با ب.ث.ژ درمانی تهیه شده است. امیدواریم که این محتوا در روند درمانی شما مفید واقع شود.

ب.ث.ژ درمانی چیست؟

ب.ث.ژ یک باکتری زنده مربوط به سل گاوی است. استفاده از BCG یک درمان رایج برای توده مثانه (از نوع غیر تهاجمی به عضلات مثانه) است و معمولاً برای تومورهایی است که احتمال توده شان در طول زمان زیاد است. BCG ، با تحریک سیستم ایمنی باعث تشدید و تقویت مبارزه با سلول های توده مثانه میشود. انتخاب درمان مناسب برای توده مثانه به مرحله و درجه توده بستگی دارد



ب.ث.ژ درمانی در پیشگیری از توده مثانه نیز تاثیر دارد.

فایده استفاده از BCG در مثانه چیست؟

استفاده از BCG درمانی همراه با جراحی (تراش

داخل مثانه) تاثیرگذارترین درمان برای توده مثانه

در مراحل اولیه و سطحی می باشد.

استفاده از BCG باعث تاخیر رشد تومور به مراحل

پیشرفته تر، کاهش احتمال برداشت کامل مثانه و


افزایش شانس به زندگی می شود.



عوارض جانبی BCG درمانی چیست؟

بیشتر افرادی که با BCG درمان می شوند با عوارضی روبرو میشوند که شایع ترین آنها عبارتند از :

- نیاز فوری بیمار به ادرار کردن
- درد حین ادرار کردن
- تب
- خون در ادرار
- کمردرد



این علائم معمولاً از ۲-۴ ساعت بعد از درمان شروع می شوند و تا ۴۸ ساعت بعد بهبود پیدا میکنند.




آموزش به بیمار

تاریخ صدور : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

تاریخ بازنگری : ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

کد پمفلت : OH-PE-B45/02

آشنایی با ب.ث.ژ درمانی



مرکز آموزشی - پژوهشی و درمانی امید

واحد آموزش سلامت

چند نکته:

- قبل از شروع سوندگذاری جهت ب.ث.ژ درمانی مثانه خود را کامل تخلیه کنید.
- اگر فردی تا ۴۸ ساعت بعد از درمان دچار تب بالای ۳۸ درجه و تعریق شدید در شب شد باید کادر درمانی خود را در جریان بگذارد، شاید اینها علامت نادر ولی خیلی جدی عفونت بدن باشند.
- پس از تخلیه مثانه حاوی محلول و واکسن ب.ث.ژ سرویس بهداشتی را (با آب و وایتکس رقیق شده) کاملاً ضدعفونی کنید.

جهت دریافت خدمات آموزشی در رابطه با بیماری ها و سوالات احتمالی با کلینیک پرستاری آموزش سلامت به صورت مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در ارتباط باشید.
ساعت فعالیت : همه روزه صبح ها ۸-۱۳

شماره تماس : ۳۸۴۲۶۰۸۴ ، داخلی ۸۵۴۴-۸۶۲۲

روش های دسترسی به آموزش های مجازی بیمارستان :

۱. وب سایت بیمارستان به آدرس
<https://omid.mums.ac.ir/index.php/nursing-services/amoozesh-salamat/43-uncategories/447-brochure>



۲. اسکن بارکد مقابل با نرم افزار بارکدخوان تلفن همراه و ورود مستقیم به صفحه مطالب آموزشی سایت

منبع : وب سایت Med line plus

نحوه انجام ب.ث.ژ درمانی چگونه است؟

BCG , مایع محلولی است که با استفاده از یک سوند وارد مثانه می شود ، این محلول باید ۲ ساعت در مثانه بماند و سپس بیمار با ادرار کردن آن را تخلیه کند.



طول دوره ب.ث.ژ درمانی چقدر است؟

این درمان به مدت ۶ هفته و هفته ای یک بار باید انجام شود ، اولین جلسه درمانی ۲-۳ هفته بعد از آخرین جراحی انجام می شود. ممکن است برای افزایش تاثیر درمان ، از درمان های کمکی هم استفاده شود.

ممکن است این درمان تا یک سال در فواصل معین ادامه داشته باشد.